

おいしい

米づくり情報

No.5

令和8年7月1日発行
J A て ん ど う
天童市農業技術指導会議

▶現在の生育状況（6月30日現在）

品種	項目	指標	R5	R6	R7	本年	平年	平年差	指標差
はえぬき	草丈 (cm)	45.0	42.63	46.44	50.4	42.3	44.6	-2.4	-2.7
	茎数 (本/㎡)	600	526	523	498	533	557	-24	-67
	葉令 (枚)	9.3	8.0	8.0	8.1	7.5	8.1	-0.7	-1.8
つや姫	草丈 (cm)	48.0	52.1	55.6	58.0	50.6	48.8	1.8	2.6
	茎数 (本/㎡)	500	544	483	482	602	556	46	102
	葉令 (枚)	9.3	8.6	8.3	8.3	7.9	8.1	-0.2	-1.4
雪若丸	草丈 (cm)	41.0	40.8	47.0	49.5	39.2	44.3	-5.1	-1.8
	茎数 (本/㎡)	590	649	496	568	469	595	-126	-121
	葉令 (枚)	9.3	8.3	9.3	8.9	8.3	8.2	0.1	-1.0

- ・はえぬき 草丈は平年並み。茎数は平年・指標より少ない。葉令は平年並み。
- ・つや姫 草丈は平年並み。茎数は平年・指標より多い。葉令は平年並。
- ・雪若丸 草丈は平年並み。茎数は平年・指標よりかなり少ない。葉令は平年並。

圃場間で生育のバラツキが大きい状況です

▶有効茎数が確保された場合 直ちに中干し・作溝を行いましょう！！

【中干し】

- ・無効分げつの抑制、根の健全化、受光態勢の良化が図られる。
- ・田植え1か月後が中干しの開始目安で7月10日頃が終了の目安です。

【作溝】

- ・圃場停滞水を速やかに排水し、「中干し」の効果を高める。
- ・効率よく圃場に水を行き渡らせることができるようになるため、登熟期の水管理が容易に。
- ・5～6本/30a程度作溝を切りましょう。

▶茎数が不足している場合

- ・茎数が不足している場合、引き続き水深2～3cmの浅水管理で茎数確保に努めましょう。
- ・穂肥前には中干しを終了できるよう、遅くとも7月に入ったら中干しに入りましょう。

▶中干し後の水管理 **中干し終了後は間断灌水(飽水管理)の徹底**

- ・中干し後は、足跡に水がたまる程度まで走り水を行い、徐々に間断灌水に移行します。
- ※飽水管理とは・・・水尻を止めた状態で入水と自然減水を繰り返し行う水管理です。

▶除草（残草対策）

薬剤名	対象雑草	使用時期	使用量（10a）
クリンチャーバスME 液剤	バエ・広葉雑草	移植後 15 日～ 収穫 50 日前まで	1 ㍓ （希釈水量 70～100 ㍓）
ロイアント乳剤		移植後 20 日～ 収穫 45 日前まで	200m l （希釈水量 100 ㍓）

- ・散布後 3 日間は入水しないで下さい。 ・散布後 2 日以内に降雨があると効果が劣ります。
- ・落水又はごく浅く湛水して散布する。（ロイアント乳剤）
- ・高温時散布、重複散布で稲の葉が黄化する場合がありますので注意して下さい。

▶穂肥

NK化成22号（20-0-20）を施用する場合

品種	はえぬき	ひとめぼれ ササニシキ	コシヒカリ
葉色	40.0 以下	37.5 以下	37.5 以下
幼穂長	1～1.5 ミリ	2～3 ミリ	2～3 ミリ
最長程の幼穂長を肉眼で確認してから穂肥			
施肥時期	7 月 10 日頃 （出穂 25 日前）	7 月 15 日頃 （出穂 20 日前）	7 月 25～28 日頃 （出穂 15～18 日前）
施肥量 10a	現物 7.5～10kg （N 成分 1.5～2.0kg）	現物 7～8kg （N 成分 1.4～1.6kg）	現物 7～10kg （N 成分 1.4～2.0kg）

※生育が過剰な場合、葉色が濃い場合は減肥する

▶倒伏軽減剤

使用薬剤	スマレクト粒剤			注意事項
使用時期	出穂 7 ～ 2 0 日前	使用回数	1 回	・散布時は湛水状態で使用する。 ・散布後 7 日間は落水、かけ流しはしない。
使用量	10 a 当たり 2kg			

※コープショート 1 4 は廃止品目のため、上記のスマレクト粒剤と【穂肥】NK化成22号を使用する。

▶良品質米・高温対策

3 か月予報では 8 月の気温は高くなる見込み です。高温による米の品質低下を抑えるため【ケイ酸質肥料】を活用しましょう。

品名：**K S K 2 8**（ケイ酸 28%、加里 17%）

散布目的	施用時期	施用量
・タンパク抑制 ・登熟向上 ・増収（粒張り向上）・倒伏軽減 ・ 高温障害（胴割れ・乳白）対策	中干し後の入水時 1 回 流し込み後 3～5 日程度止水 （出穂期前まで施用する）	1.4kg 入（1 本）/10a 4.2kg 入（1 個）/30a 14kg 入（1 缶）/1ha